Docteurs M. AHMAR - C. CASILE - M. CHENNOUFI – S. CRAIGHERO – I. DENIS - T. GARRIVIER - J.C. LAHAROTTE - D. MALYS GARIBAL - S.M BIENE - M. MOHALLEM FONSECA – R.O. MULOT H. OUZIEL - J.P. PERNOUD - M. PERRIER - R. QUIN - A. ROUSSEL - L. SOUSSAN - A. VIALLE

RADIOLOGIE GENERALE ET VASCULAIRE – ECHOGRAPHIE – MAMMOGRAPHIE – SCANNER – RADIOLOGIE DENTAIRE – IRM



BIOPSIE THYROIDIENNE

Au cours des différents examens de la glande thyroïde, certaines anomalies repérées par le médecin peuvent nécessiter une cytoponction thyroïdienne.

Vous êtes libre d'accepter ou de refuser cet examen.

Qu'est-ce qu'une cytoponction thyroïdienne?

La cytoponction thyroïdienne est un geste simple et bien toléré qui consiste à introduire une aiguille très fine à travers la peau jusqu'à l'anomalie détectée par le médecin pour recueillir des cellules. Les cellules recueillies sont ensuite analysées au microscope par un médecin spécialiste appelé anatomopathologiste.

La cytoponction permet d'apprécier la nature bénigne ou maligne de l'anomalie et d'éviter le cas échéant une intervention chirurgicale.

La cytoponction peut être réalisée soit par un endocrinologue, soit par un radiologue.

Comment se déroule l'examen?

Vous êtes allongé(e) sur la table d'examen.

Le médecin repère la zone à ponctionner et le trajet de l'aiguille.

IRM
Z.I. Vovray
18, rue de la
Césière
74000 ANNECY
04 50 63 57 37

SCANNER DU MT BLANC Chemin Tour de la Reine 74000 ANNECY 04 50 57 86 06 CLINIQUE D'ARGONAY 685 route de Menthonnex 74370 PRINGY 04 50 27 28 85 ANNECY LE VIEUX 20 av des carrés 74940 ANNECY Le VIEUX 04 50 27 71 73 LE GALILEE 50 av. de la République 74960 CRAN GEVRIER 04 50 67 07 07 LE PERICLES Allée de la Mandallaz 74370 METZ TESSY 04 50 10 15 15 RUMILLY

1 rue de la foret
74150 RUMILLY
04 50 01 48 86

SEYNOD CC champ fleuri 4 bis place saint jean 74600 SEYNOD 04 50 69 07 68

Docteurs M. AHMAR - C. CASILE - M. CHENNOUFI – S. CRAIGHERO – I. DENIS - T. GARRIVIER - J.C. LAHAROTTE - D. MALYS GARIBAL - S.M BIENE - M. MOHALLEM FONSECA – R.O. MULOT H. OUZIEL - J.P. PERNOUD - M. PERRIER - R. QUIN - A. ROUSSEL - L. SOUSSAN - A. VIALLE

RADIOLOGIE GENERALE ET VASCULAIRE – ECHOGRAPHIE – MAMMOGRAPHIE – SCANNER – RADIOLOGIE DENTAIRE – IRM

La zone de ponction est désinfectée.

Le médecin suit la mise en place de l'aiguille sous contrôle échographique.

Trois ou quatre prélèvements sont généralement nécessaires.

Les prélèvements terminés, un petit pansement est placé sur le point de ponction, à conserver quelques heures.

Combien de temps l'examen dure-t-il?

Environ 25 minutes.

Ensuite, vous patientez en salle d'attente afin de vérifier l'absence de complication (hématome).

Est-ce douloureux?

Réalisée à l'aide d'aiguilles fines, la cytoponction thyroïdienne effectuée en ambulatoire est peu douloureuse. La gêne ressentie est comparable à celle d'une prise de sang.

Elle ne nécessite pas d'anesthésie locale.

Les précautions à prendre :

Avant la cytoponction, veiller à :

Ne pas prendre d'aspirine (ni ses dérivés) dans les 8 jours précédant la cytoponction En accord avec le médecin traitant, arrêter tout traitement anticoagulant avant la cytoponction Signaler une éventuelle allergie au latex

RUMILLY

Docteurs M. AHMAR - C. CASILE - M. CHENNOUFI – S. CRAIGHERO – I. DENIS - T. GARRIVIER - J.C. LAHAROTTE - D. MALYS GARIBAL - S.M BIENE - M. MOHALLEM FONSECA – R.O. MULOT H. OUZIEL - J.P. PERNOUD - M. PERRIER - R. QUIN - A. ROUSSEL - L. SOUSSAN - A. VIALLE

RADIOLOGIE GENERALE ET VASCULAIRE – ECHOGRAPHIE – MAMMOGRAPHIE – SCANNER – RADIOLOGIE DENTAIRE – IRM

Après la cytoponction, veiller à :

Rester allongé(e) 10 minutes sur le lit d'examen et comprimer le point de ponction

Rester assis(e) quelques minutes avant de se lever

Attendre en salle d'attente 20 minutes

Le médecin ou l'assistante vérifiera le point de ponction avant de vous laisser partir.

En cas de douleur après la ponction, vous pouvez prendre du paracétamol si nécessaire mais pas d'aspirine (ni ses dérivés).

Quand obtient t-on les résultats?

Le résultat de la cytoponction nécessite une analyse spécialisée. Il est communiqué au médecin ayant prescrit le prélèvement, dans un délai de 1 à 2 semaines. Vous pourrez alors le revoir pour faire le point avec lui.

Cet examen comporte-t-il un risque?

Tout acte médical sur le corps humain comporte un risque de complication.

Vous ressentirez peut-être une sensation de tension dans le cou mais qui ne doit pas excéder quelques heures.

L'arrêt d'un éventuel traitement anti coagulant, la finesse des aiguilles utilisées et la compression après ponction, sont généralement suffisantes pour éviter la survenue d'un hématome.

IRM
Z.I. Vovray
18, rue de la
Césière
74000 ANNECY
04 50 63 57 37

SCANNER DU MT BLANC Chemin Tour de la Reine 74000 ANNECY 04 50 57 86 06 CLINIQUE D'ARGONAY 685 route de Menthonnex 74370 PRINGY 04 50 27 28 85 ANNECY LE VIEUX 20 av des carrés 74940 ANNECY Le VIEUX 04 50 27 71 73

LE GALILEE 50 av. de la République 74960 CRAN GEVRIER 04 50 67 07 07 LE PERICLES Allée de la Mandallaz 74370 METZ TESSY 04 50 10 15 15 RUMILLY

1 rue de la foret
74150 RUMILLY
04 50 01 48 86

SEYNOD CC champ fleuri 4 bis place saint jean 74600 SEYNOD 04 50 69 07 68

Docteurs M. AHMAR - C. CASILE - M. CHENNOUFI – S. CRAIGHERO – I. DENIS - T. GARRIVIER - J.C. LAHAROTTE - D. MALYS GARIBAL - S.M BIENE - M. MOHALLEM FONSECA – R.O. MULOT H. OUZIEL - J.P. PERNOUD - M. PERRIER - R. QUIN - A. ROUSSEL - L. SOUSSAN - A. VIALLE

RADIOLOGIE GENERALE ET VASCULAIRE – ECHOGRAPHIE – MAMMOGRAPHIE – SCANNER – RADIOLOGIE DENTAIRE – IRM

Cependant, si après la ponction, vous constatez un gonflement du cou, ceci peut traduire un hématome qui disparaitra le plus souvent spontanément.

Une nouvelle ponction peut être nécessaire

Dans un environ 20% des cas, le prélèvement du fait du nombre peu important de cellules à analyser, peut ne pas être suffisamment informatif pour un diagnostic définitif.

Madame, Monsieur
A personnellement rempli cette fiche le
Et donné son accord pour que l'examen soit réalisé.
Signature

Dans ce cas, une nouvelle ponction est proposée.